



# FARMATAN LIQUID

VLOEIBAAR AANVULLEND DIERVOEDER VOOR PLUIMVEE



BEVORDERT DE DARMGEZONDHEID

ONDERSTEUNT HET IMMUUNSYSTEEM

DAEM ECO BVBA  
AGRO & FEED SPECIALITIES  
Nerumstraat 7 B-9340 LEDE  
T: +32 53 80 92 22  
Mail: [c.daem@daemeco.be](mailto:c.daem@daemeco.be)

## - ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING:

- Het drinkwatersysteem vóór het gebruik van FARMATAN LIQUID goed reinigen.
- Verwijder eventuele biofilm.
- Bereken hoeveel water je nodig hebt voor 8:00h per dag.
- Bereidt elke dag een verse oplossing:
  - Meng 1 à 2 liter in 1000L drinkwater,
  - Gebruik bij voorkeur een elektronische doseerpomp.
- Cl<sup>-</sup> mag gebruikt worden, mits het respecteren van de maximale dosering (5%)
- H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> en zuren hebben geen negatief effect op de werking van Farmatan Liquid.

## - BASISPROGRAMMA'S VOOR:

### 1. VLEESKUIKENS:



- Bij aankomst in de stal: 1L/1000L - 3 à 5 dagen - 8u/dag
- Bij voederwissel: 1L/1000L - 3 à 5 dagen - 8u/dag
- Gedurende 3 dagen voor de vaccinatie: 1L/1000L - 3 à 5 dagen - 8u/dag
- Als dunne mest: 2L/1000L - 2 à 3 dagen, 8u/dag
- Voorkomen van EN: 2-3L/1000L - 3 dagen, 8u/dag

### 2. LEGKIPPEN:



- Bij aankomst van de jonge hennen in de stal: 2L/1000L – 3 à 5 dagen – 8u/dag
- Dunne mest: 2-3L/1000L – 2 à 3 dagen – 8u/dag.
- Voorkomen van EN: 2-3L/1000L – 2 à 3 dagen – 8u/dag
- 2<sup>de</sup> fase van de leg: regelmatig kuur met 2-3L/1000L gedurende 3 dagen – 8u/dag

### 3. KALKOENEN:



- BIJ AANKOMST: 1L/1000L – 3 à 5 dage, 8u/dag
- BIJ ELKE VOEDERWISSEL: 1L/1000L – 2 à 3 dagen – 8u/dag
- Dunne mest: 2L/1000L - 2 à 3 dagen – 8u/dag
- Voorkomen van EN: 2-3L/1000L -3 dagen – 8u/dag

**Verpakking: 10L cans -750L/palet; vaten van 220L; 1000L IBC**